

**HÄCK OCH BUSK
BESKÄRNINGSS KURS**



Kontakt mail: info@skonatradgard.se
Kontakt telefon: 073-5331237

BESKÄRNING OCH FÖRYNGRING AV BUSKAR/HÄCKAR

BESKÄRNING

Det finns olika variationer av beskärning, *putsning* en tät och uppvuxen buske/häck, *gallring* en allt för tät buske/häck behöver vid jämna mellanrum gallras på kraftiga vedartade grenar, *föryngring* ibland behöver man beskära ned hela busken/häcken för att den skall få börja om på nytt.

PUTSNING: Det är när man med sekator eller häcksax putsar dom yttersta topparna på busken/häcken. Denna beskärning görs under JAS-månaderna, men har man en sen blommande häck som t.ex. Ölandstok skall det göras på våren. Beskär aldrig under blomningsperioden tänk på våra pollinerare och mångfalden.



Som ni ser på bilden så finns inga utstående årsskott.



Denna har alla sina årsskott kvar och ser då ganska "rufsigt" ut.

GALLRING: Här tar man endast sjuka och vedartade grova grenar. Beskär ända ned till marken, lämna ca 5 cm för ny återväxt. Denna beskärning görs vårvintern februari-april, självklart finns även här undantag som forsythia som beskärs endast efter blomning, svarta vinbär beskärs i oktober. Skulle man under sommaren upptäcka sjukdomar så självklart beskär man bort de sjuka delarna.



Busken/häcken får mer luft och kan skjuta nya fina skott. Passa på att rensa bort alla löv och andra rester som ligger i grenverket vid marken så slipper du många sjukdomar och röta.

FÖRYNGRING/DELVIS FÖRYNGRING: När en buske/häck har mestadels gröna blad upp till eller börjar bli mer ett träd i stammen än sirliga fina grenar då har det gått för långt och det är bara att ta ned hela för att börja om, du kan även göra en delvis föryngring om du har en bred häck. Då tar man bara ut- eller insida och väntar i 2-3 år sedan tar man den andra delen.

Bästa årstiden för detta är under februari-april, självklart har vi även här undantag som t.ex. amerikansk hagtorn den kan föryngras från sen höst oktober-april.



Här ser vi en häck som tyvärr har blivit totalt fel beskuren från början, det är en mispel som skall vara en buske men har fått blivit träd. Denna går troligtvis inte att rädda då stammarna är så tjocka.




Här ser vi en häck som är på väg att få gå för långt, men här finns det potential till ny återväxt.

Här beskär man ända ned till marken spara ca 5 cm för ny återväxt.

Hur ska man då beskära sin häck?

En bra regel är att hålla en pyramid form på häcken då kommer det alltid in solljus så att nya fina grenar växer ut.



VAD HÄNDER NU?

Efter att du har beskurit/gallrat eller föryngrat din häck bör du ge den gödsel så att den får ny växtkraft, glöm inte vatten även våra gamla etablerade buskar och häckar behöver vatten i och med den klimatförändring vi har fått. Det är inte bara solen som torkar ut våra växter, vinden är värre än solen. När det blåser så skakas vätskan i bladen ut och finns det inget nytt att tillgå så vissnar bladen och trillar av i förtid.

Lika så är det när det gäller angrepp av ohyra/insekter, svampsjukdomar mm, gödslar och vattnar du regelbundet så får du friskare och grönare buskar/häckar.

Vad skall du använda för gödsel, vi föreslår naturgödsel som ko-, höns- eller hästgödsel tänk på att det skall vara väl brunnen så att det inte bränner rötterna.

Barr häckar som gran och thuja så finns det speciellt gödsel för barrväxter, men har du en uppsamlare på gräsklipparen så kan du använda ett tunt lager (max 3-4cm) med gräsklipp i din häck som gödsel, det håller även ogräset borta.

SJUKDOMAR/SKADEDJUR

Cinnobergömming (rödvårtsjuka), *Nectria cinnabarina*

Svampen angriper olika växtslag, man upptäcker den lätt tack vare de cinnoberröda små utväxter som sitter oftast tätt på stammar och grenar.

Svampen angriper i förstahand död ved, men har den fått ett fäste i ett dött parti på en gren eller stam sprider svampen sig gärna vidare till friska partier som senare dör.

Oxbärssläktet, *Cotoneaster*, är dom buskar/häckar som har drabbats hårdast tidigare men idag sprider den sig till alla slags buskar och träd.

Åtgärder: Beskär bort all synlig svamp, beskär 10-15 cm in på frisk ved, se till att snittytan är så slät och ren som möjligt det bör inte vara några ojämnheter så sporena får fäste i sårytan.

Bortskurna delar eldas eller slängs i soporna.

Lägg inte i komposten då sjukdomen sprids vidare.



MJÖLDAGG

På vissa buskar kan mjöldagg uppstå när jorden är dåligt dränerad eller om det är mycket torr växtplats.

Ta bort angripna löv direkt bränn eller kasta i soporna, lägg inte på komposten.

Bekämpa med såpvatten 2-3 gånger med en veckas mellanrum.



SKADEDJUR

Bladstekellarven kan snabbt göra stor skada på träd och buskar.



Åtgärder vid angrepp av bladstekel och gröna bladlöss:
Spruta kallt vatten med hård stråle, spraya sedan med såpvatten upprepa detta 2-3 gånger med 1 veckas mellanrum.

Bladlöss svarta



Bladlöss gröna



När det gäller den svarta bladlusen så är den lite svårare att få bort den klarar såpvatten och det kalla vattnet. För att bli av med dessa behöver man doppa de angripna växtdelarna i varmt vatten, 50-54 grader blandat med såpa. Behandlingen måste upprepas 2-3 gånger med 5-6 dagars mellanrum. Är det ett mindre angrepp kan man nypa bort den angripna delen.